IO-CHI-16

" FARMACI DA SOSPENDERE NEL PREOPERATORIO"

Emesso da:	Primario Ortopedia	Data 21/04/2021	Firma: .....
	Responsabile Anestesia	Data 21/04/2021	Firma: .....
Approvato da:	Direttore Sanitario	Data 21/04/2021	Firma: .....
Verificato da:	Responsabile SGQ	Data 21/04/2021	Firma: .....

N. Rev.	Descrizione Modifiche	
4	08/09/2016	Revisione globale del documento
5	04/09/2019	Revisione globale del documento
6	21/04/2021	Revisione globale del documento

ANTICOAGULANTI

COUMADIN O SINTROM 5 gg prima del ricovero più controllo coagulazione il giorno del ricovero.

Sostituire con **CLEXANE ENOXAPARINA) 4000 UI**
se RISCHIO MEDIO BASSO
se RISCHIO ELEVATO **(vedi *)**

NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI (NAO/DOAC)

PRADAXA (DABIGRATAN), ELIQUIS (APIXABAN), XARELTO (RIVAROXABAN), LIXIANA (EDOXOBAN) sec funzione renale → 24 – 48 ore prima dell'intervento chirurgico

ANTIAGGREGANTI

TIKLID / TICLOPIDINA → 14 gg prima dell'intervento
ASCRIPTIN /AC.ACETILSALIC 300mg → 5 gg prima dell'intervento

PLAVIX / CLOPIDROGREL → 5 gg prima dell'intervento
BRILIQUE / TICAGRETOL → 5 gg prima dell'intervento

ANTICONCEZIONALI E TERAPIA SOSTITUTIVA

→ 1 mese prima dell'intervento

ANTIESTROGENI

TAMOXIFENE, NOVALDEX, RALOXIFENE ED ALTRI SIMILI

→ almeno 1 mese prima in base al peso
(eventuale consulto oncologico)

ARIMIDEX (ANASTRAZOLO), FEMARA, ARONASIN (EXEMESCANE)

→ NON SOSPENDERE
(aumenta del 3% la probabilità di trombosi)

IMMUNOSOPRESSORI :

CICLOSPORINA: sospendere il giorno dell'intervento in caso di anestesia generale.
PLAQUENIL (IDROSSICLOROCHINA): sospendere 2 settimane prima.
AZATIOPRINA, 6-MERCAPTOURINA, CICLOFOSFAMIDE: non sospendere .
Anticorpi monoclonali anti-TNF:ENBREL (ETANECERPT), Inflixmab (Remicade), Adalimumab (Humira): Parere specialistico necessario. Sospensione > 2-3 settimana prima dell'intervento (rischio settico).
METHOTREXATE, ARAVA: sospendere due settimane prima dell'intervento chirurgico e riprenderli una settimana dopo.
ACE-inibitori e antagonisti dei recettori dell'angiotensina 2: stop> 12 ore prima dell'intervento se trattamento anti-ipertensivo, mantenere in caso di trattamento dell'insufficienza cardiaca.

Metformina: sospendere 24 ore prima dell'intervento.

* **Se rischio elevato** (protesi meccanica mitralica, protesi meccanica aortica non recente o associata a fibrillazione atriale, protesi valvolare con pregresso tromboembolismo arterioso, valvulopatia mitralica, tromboembolismo recente entro il mese)

< 60 Kg 2000 UI per 2 60-80 Kg 4000 UI per 2 > 80 Kg 6000 UI per 2