



NOTA INFORMATIVA MEZZO DI CONTRASTO

Nel corso dell'indagine radiologica richiesta, per poter fornire elementi utili alla diagnosi del Suo caso, è necessario somministrare mediante iniezione in vena una particolare sostanza, iodata non ionica, detta mezzo di contrasto (mdc).

Questo permette di riconoscere con maggior chiarezza sia strutture normali (in particolare vie escretrici urinarie, vasi arteriosi e venosi) sia eventuali processi patologici e spesso di precisarne la natura.

EFFETTI COLLATERALI E REAZIONI AVVERSE

Il mezzo di contrasto può raramente provocare alcune reazioni avverse che vengono classificate come

LIEVI : nausea, prurito, vomito.

MODERATE: vomito profuso, orticaria diffusa, edema facciale broncospasmo.

Rarissimamente, si possono verificare reazioni

SEVERE: shock ipotensivo, edema polmonare, arresto cardio-respiratorio che, in casi eccezionali, possono provocare il decesso.

IMPORTANTE

L'esame richiede il digiuno dalla mezzanotte; portare con sé

- l'impegnativa del medico,
- questo modulo firmato dal medico e dal paziente
- tutta la documentazione (precedenti tac, ecografie, radiografie, cartella clinica) inerente alla patologia per cui si esegue la tac.
- I seguenti esami del sangue: azotemia, creatinina, clearance della creatinina, glicemia, protidogramma (fatti non oltre 30 gg precedenti l'esame).

Firma del paziente per presa visione
