



## SERVIZIO DI RADIOLOGIA

### PREPARAZIONE DESENSIBILIZZANTE PER PAZIENTI CON RIFERITA ALLERGIA AL MEZZO DI CONTRASTO

La terapia è indicata per pazienti con riferita allergia al mezzo di contrasto.

Deve essere effettuata 3 giorni prima dell'esame.

**URBASON cp da 4 mg 1 cp x 3 volte al giorno (ogni 8 ore: 8- 16- 24)**

Da prendere 3 giorni prima dell'esame + 1 compressa la mattina dell'esame

**PANTOPAN cp da 40 mg 1 cp al mattino**

Da prendere 3 giorni prima dell'esame + 1 compressa la mattina dell'esame

**AERIUS cp da 5 mg 1 cp sera (ore 20)**

Da prendere 3 giorni prima dell'esame + 1 compressa la mattina dell'esame

**Il Responsabile del Servizio**

.....

Questa premedicazione è già in uso presso:

- OSPEDALE GENERALE DI ZONA "SAN CAMILLO" DI TREVISO
- AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITA' DI FERRARA
- ISTITUTO DIAGNOSTICO ANTONIANO s.p.a PADOVA

#### Sitografia di consultazione

- 1) Ospedale San Camillo di Treviso - [treviso.figliesancamillo.it/.../MO%20AS%2046\\_...](http://treviso.figliesancamillo.it/.../MO%20AS%2046_...) accesso 23.01.13
- 2) [www.ospfe.it/reparti.../modulo-consenso-mezzi-contrastografici](http://www.ospfe.it/reparti.../modulo-consenso-mezzi-contrastografici) accesso 23 gennaio 2013
- 3) [www.idapadova.it](http://www.idapadova.it) accesso 23.01.2013

**[Mezzi di contrasto | Linee guida www.sirm.org/it/mezzi-di-contrasto.html](http://www.sirm.org/it/mezzi-di-contrasto.html)**

**Raccomandazioni all'uso dei mezzi di contrasto organo-iodati e per Risonanza Magnetica per via iniettiva. Considerazioni radiologiche e medico-legali.**

(O. Tamburrini, G. Gavelli, F. De Ferrari, S. Perotti) accesso 23 gennaio 13

Firma Medico curante

.....

Firma del Paziente

.....

Data.....

Data.....