IO-CHI-16

" FARMACI DA SOSPENDERE NEL PREOPERATORIO"

Emesso da:	Primario Ortopedia	Data 04/09/2019	Firma: .....
	Responsabile Anestesia	Data 04/09/2019	Firma: .....
Approvato da:	Direttore Sanitario	Data 04/09/2019	Firma: .....
Verificato da:	Responsabile SGQ	Data 04/09/2019	Firma: .....

N. Rev.	Descrizione Modifiche
4	08/09/2016 Revisione globale del documento
5	04/09/2019 Revisione globale del documento

ANTICOAGULANTI

COUMADIN O SINTROM => 5gg prima del ricovero più controllo coagulazione il giorno del ricovero. Sostituire con **CLEXANE (ENOXAPARINA) 4000 UI sc** RISCHIO MEDIO BASSO.
Se RISCHIO ELEVATO **(vedi*)**

NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI (NAO)
PRADAXA (DABIGRATAN), ELIQUIS (APIXABAN), XARELTO (RIVAROXABAN)
=> 24-48 ore prima dell'intervento chirurgico

ANTIAGGREGANTI
TIKLID (TICLOPIDINA) => 14gg prima dell'intervento

PLAVIX /CLOPIDROGREL => 5gg prima dell'intervento
BRILIQUE/TICAGRETOL => 5gg prima dell'intervento

ANTICONCEZIONALI E TERAPIA SOSTITUTIVA
=> 1 mese prima dell'intervento

ANTIESTROGENI
TAMOXIFENE, NOVALDEX, RALOXIFENE ED ALTRI SIMILI
=> almeno 1 mese prima in base al peso (eventuale consulto oncologico)

ARIMIDEX (ANASTRAZOLO), FEMARA, ARONASIN (EXEMESCANE)
=> **NON SOSPENDERE**
(aumenta del 3% la probabilità di trombosi)

IMMUNOSOPRESSORI :

CICLOSPORINA: sospendere il giorno dell'intervento in caso di anestesia generale.
PLAQUENIL (IDROSSICLOROCHINA) : sospendere 2 settimane prima.
AZATIOPRINA, 6-MERCAPTOURINA, CICLOFOSFAMIDE : non sospendere .
Anticorpi monoclonali anti-TNF:ENBREL (ETANECERPT), Inflixmab (Remicade), Adalimumab (Humira) : Parere specialistico necessario. Sospensione > 2-3 settimana prima dell'intervento (rischio settico).
METHOTREXATE, ARAVA : sospendere due settimane prima dell'intervento chirurgico e riprenderli una settimana dopo.
ACE-inibitori e antagonisti dei recettori dell'angiotensina 2: stop> 12 ore prima dell'intervento se trattamento anti-ipertensivo, mantenere in caso di trattamento dell'insufficienza cardiaca.

Metformina: sospendere 24 ore prima dell'intervento.

*** Se rischio elevato** (protesi meccanica mitralica, protesi meccanica aortica non recente o associata a fibrillazione atriale, protesi valvolare con pregresso tromboembolismo arterioso, valvulopatia mitralica, tromboembolismo recente entro il mese)
< 60 Kg 2000 UI per 2 60-80 Kg 4000 UI per 2 > 80 Kg 6000 UI per 2